

ROBSON MOTTA DOMINGUES

RESUMO ANÁLISE FARMACOGENÉTICA

RESULTADOS

	CYP1A2	CYP2C9	CYP2C19	CYP2D6	CYP3A4	CYP3A5
GENÓTIPO	*1F*1F	*1*2	*1*1	*1*5	*1*1	*1*1
FENÓTIPO	Ultrarrápido	Intermediário	Normal	Intermediário	Normal	Normal

VENLIFT – Cloridrato de Venlafaxina

Toxicidade AUMENTADA



A análise genética demonstra que o paciente apresenta um perfil genético associado a uma toxicidade aumentada frente ao medicamento. Com relação a fármacos, este perfil corresponde a um metabolismo intermediário-lento, enquanto que a pró-fármacos corresponde a um metabolizador rápido. Em ambos os casos recomenda-se uma ligeira diminuição da dose padrão, podendo substituir o medicamento caso ocorram reações adversas.

RIVOTRIL - Clonazepam

Toxicidade PADRÃO



A análise genética demonstra que o paciente apresenta um perfil genético associado a toxicidade e resposta padrões frente ao medicamento. Apresenta uma resposta normal com relação aos fármacos e pré-fármacos. Em ambos os casos recomenda-se a utilização de uma dose padrão para uma resposta terapêutica adequada.

SIBUTRAMINA – Cloridrato de Sibutramina

Apesar da TOXICIDADE PADRÃO, a administração concomitante de inibidores enzimáticos tais como o cetoconazol, a eritromicina e a cimetidina podem aumentar as concentrações plasmáticas de sibutramina. Recomenda-se cautela na administração concomitante da sibutramina com outros inibidores enzimáticos do metabolismo do citocromo P450 (3 A4)

Toxicidade PADRÃO



A análise genética demonstra que o paciente apresenta um perfil genético associado a toxicidade e resposta padrões frente ao medicamento. Apresenta uma resposta normal com relação aos fármacos e pré-fármacos. Em ambos os casos recomenda-se a utilização de uma dose padrão para uma resposta terapêutica adequada.